

Organisatie opvang tandletsel in de algemene praktijk

Tandletsel hoort thuis in de algemene praktijk

Verwijs pas naar kaakchirurg, huisarts of ziekenhuis wanneer bij het eerste onderzoek blijkt dat de verwonding van dien aard is dat deze niet in de algemene praktijk kan worden behandeld. Voor overplaatsing zal overleg en een warme overdracht moeten plaatsvinden tussen tandarts en kaakchirurg, huisarts of ziekenhuis.

Opvang tijdens een normale werkdag

Instrueer de receptioniste of assistente dat het programma moet worden onderbroken voor een trauma (gaat altijd voor).

Telefoonkaart voor receptioniste of assistente

Laat de receptioniste of assistente de telefoonkaart gebruiken bij het eerste telefonische contact als sprake is van tandletsel. Let hierbij op dat er maximaal 2 schakels van patiënt tot tandarts zijn.

Tandletsel bij volwassenen

Overleg met de huisarts van de patiënt over de noodzaak van een tetanusinjectie binnen 48 uur. De meeste kinderen zijn beschermd tegen tetanus. Bij twijfel: controleer of het kind een tetanusinjectie heeft gekregen in het kader van het vaccinatieprogramma.

Spoedgevallendienst

Tijdens ANW-uren kan de tandarts de dienst overdragen aan een dienstkring of spoedpraktijk. Ook daar geldt dat

degene die de telefoon aanneemt moet weten dat een tandletsel altijd een spoedgeval is. Losse, verplaatste en uitgeslagen tanden zullen direct gezien moeten worden. Alleen de tandarts zelf kan beoordelen of in een bepaald geval het consult kan wachten tot het verzamelspreekuur. Bij twijfel is onderzoek en niet de telefonisch gestelde diagnose leidend en wordt daarom geadviseerd de patiënt direct te laten komen en de tandarts in te lichten. Zie ook richtlijn Spoedgevallendienst.

Overdracht behandeling tijdens spoedgevallendienst

Wees er zeker van dat de behandeling wordt voortgezet door de eigen tandarts van de patiënt. Informeer de eigen tandarts en controleer of de tandarts de informatie heeft ontvangen. Is de eigen tandarts niet bereikbaar of heeft de patiënt geen eigen tandarts, dan moet u zelf zorgdragen voor het uitvoeren van de vervolgbehandeling totdat de eigen tandarts hiertoe (weer) in staat is, c.q. een stabiele situatie bereikt is. U bent niet verplicht andere behandelingen bij de patiënt uit te voeren.

Patiënt zegt afspraak voor vervolgbehandeling af

Neem contact op met de patiënt en wijs hem/haar op de risico's. Geef aan hoelang de behandeling maximaal kan worden uitgesteld.

Patiënt ziet af van vervolgbehandeling

Stuur de patiënt een brief waarin wordt bevestigd dat de patiënt afziet van verdere behandeling en welke risico's de patiënt daardoor loopt.