

پس از آنکه درمان ریشه دندان برای شما انجام شده باشد...

1. طبیعی است که پس از آن کمی درد به خاطر ضد عفونی و درد مجازی داشته باشد.

2. در این صورت می‌توانید مسکن پاراستامول استفاده کنید.

3. در موارد زیر باید با دندانپزشک تماس بگیرید:

- پس از 48 ساعت هنوز در موقع خوردن غذا و فشار دادن دندانها روی هم درد شدید دارید.
- ورم شدید به وجود آمده (در این صورت شاید مصرف آنتی‌بیوتیک لازم باشد)

پس از عمل جراحی (کشیدن دندان یا دندان آسیا)...

1. در صورت وجود درد اجازه مصرف پاراستامول دارید.

2. در صورت وجود درد اجازه مصرف اسپیرین ندارید، به دلیل تاثیر رقیق کننده خون (خطر خونریزی).

3. اجازه خوردن و نوشیدن دارید، اما توجه کنید زیاد گرم نباشد. خوردن ماست/فلا (یک نوع لبنیات هلندی) را توصیه نمی‌کنیم.

4. اجازه شستشوی دوباره و فروبردن زبان در زخم نیست.

5. بهتر است در 2 تا 3 روز پس از عمل، غذا را با طرف دیگر دهان بجوید.

6. اگر سیگار می‌کشید سعی کنید در طول روز تا حد ممکن کمتر سیگار بکشید.

7. در صورت خونریزی دوباره باید با دندانپزشک مشورت کرد.

خونریزی دوباره با طعم خون اشتباه گرفته نشود، چون این عادی است.